

Aperçu des médicaments antirétroviraux

MOLÉCULES À COMBINER AVEC D'AUTRES

Abréviations	Molécules	Produits	Formes	Doses standard chez l'adulte	Effets indésirables
INHIBITEURS D'ENTRÉE					
FTR	Fostemsavir	Rukobia (ViiV)	Comprimés: 600 mg	1 cp. 2 × / j.	Bien toléré, rarement des maux de tête, des nausées, des diarrhées, une éruption cutanée. Non recommandé pendant la grossesse.
MVC	Maraviroc	Celsentri (ViiV)	Comprimés: 150 mg, 300 mg	300 mg 2 × / j. ou 150 mg 2 × / j. avec RTV ou Cobi ou 600 mg 2 × / j. avec EFV ou ETV	Bien toléré, rarement des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées.
INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)					
3TC	Lamivudine	3TC ou Epivir (ViiV)	Comprimés: 150 mg, 300 mg, Solution buvable: 10 mg/ml (Flacon 240 ml)	1 cp. 150 mg 2 × / j. ou 1 cp. 300 mg 1 × / j.	Peu d'effets indésirables.
AZT	Zidovudine	Retrovir (ViiV)	Capsules: 250 mg	1 cap. 2 × / j.	Nausées, vomissements, sensation de ballonnement, maux de tête et douleurs musculaires.
ABC	Abacavir	Ziagen (ViiV) Génériques en combinaisons fixes uniquement	Comprimés: 300 mg, Solution buvable: 20 mg/ml (Flacon 240 ml)	300 mg 2 × / j. ou 600 mg 1 × / j.	Rarement éruption cutanée, nausées, diarrhée. Risque accru de maladie cardiovasculaire, notamment d'infarctus du myocarde. Non recommandé en prophylaxie post-exposition. Administration uniquement en cas de détermination négative du HLA-B*57:01.
FTC	Emtricitabine	Emtriva (Gilead) Génériques en combinaisons fixes uniquement	Capsules: 200 mg	1 cp. 1 × / j.	Peu d'effets indésirables.
TAF	Ténofovir alafénamide fumarate	Disponible uniquement en combinaisons fixes	Comprimés: avec 10 mg, 25 mg	1 cp. 1 × / j.	Généralement bien toléré, parfois une prise de poids, hausse du cholestérol, une stéatose hépatique (risque accru).
TDF	Ténofovir disoproxil fumarate	Original: Viread (Gilead) Génériques: Mepha, Mylan, Sandoz	Comprimés: 245 mg	1 cp. 1 × / j., ††	Généralement bien toléré, rarement des effets secondaires rénaux et une diminution de la densité osseuse en combinaison avec des inhibiteurs de protéase, légère perte de poids.
INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)					
DOR	Doravirine	Pifeltro (MSD)	Comprimés: 100 mg	1 cp. 1 × / j.	Relativement bien toléré, très rarement des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux et des éruptions cutanées.
EFV	Efavirenz	Original: Stocrin/Sustiva (MSD) Génériques: Mepha, Sandoz, Arrow, Mylan, Teva	Comprimés: 600 mg	1 cp. 1 × / j., †† Le soir, de préférence avant le coucher. Éviter la prise avec un repas gras.	Au cours des premières semaines, cauchemars fréquents, confusion, vertiges, étourdissements, dépression, troubles de la concentration, insomnie ainsi que troubles du taux de lipides et, rarement, éruption cutanée.
ETV	Etravirine	Intelence (Janssen)	Comprimés: 200 mg	1 cp. 2 × / j. ou 2 cp. 1 × / j., après ††	Rarement, une éruption cutanée légère au cours de la deuxième semaine, rarement des nausées. Peu de données sur l'utilisation pendant la grossesse.
NVP	Névirapine	Original: Viramune (Boehringer) Génériques: Mylan, Sandoz, Mepha	Comprimés : 200 mg, Comprimés retard : 400 mg	1 cp. 200 mg 2 × j. 1 cp. ret. 400 mg 1 × / j.	Fréquemment, une éruption cutanée. Non recommandé pendant la grossesse ou comme prophylaxie post-exposition.
RPV	Rilpivirine	Edurant (Janssen)	Comprimés: 25 mg	1 cp. 1 × / j., ††	Rarement des effets secondaires, le plus souvent une éruption cutanée et occasionnellement des nausées, une dépression, des troubles du sommeil, des maux de tête. Contre-indiqué avec les bloqueurs d'acide gastrique.
		Rekambys (Janssen)	Dépôt injection susp. 900 mg/3 ml	1 inj. IM/2 mois (combiné avec Cabotegravir)	Rarement des effets secondaires, le plus souvent une éruption cutanée et occasionnellement des nausées, une dépression, des troubles du sommeil, des maux de tête.
INHIBITEURS DE L'INTÉGRASE (INI)					
BIC	Bictegravir	Disponible uniquement en combinaisons fixes	Comprimés: avec 50 mg BIC	1 cp. 1 × / j.	Globalement bien toléré, parfois une prise de poids. Rarement des troubles du sommeil et des maux de tête. Peu de données sur l'utilisation pendant la grossesse.
CAB	Cabotegravir	Vocabria (ViiV)	Comprimés: 30 mg Dépôt injection susp. 600 mg/3 ml	1 cp. 1 × / j. (combiné avec Rilpivirine) 1 inj. IM/2 mois (combiné avec Rilpivirine)	Rarement des troubles du sommeil, des maux de tête, de la fièvre. Rarement, des réactions au site d'injection, des troubles du sommeil, des maux de tête, de la fièvre.
DTG	Dolutegravir	Tivicay (ViiV)	Comprimés dispersibles: 5 mg Comprimés pelliculés : 10 mg, 25 mg, 50mg	1 cp. 50 mg 1 × / j.	Occasionnellement, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, des maux de tête et une prise de poids. Rarement une éruption cutanée, des nausées.
EVG/c	Elvitegravir et Cobicistat	Disponible uniquement sous forme de combinaison fixe	Comprimés: 150 mg EVG et 150 mg Cobi	1 cp. 1 × / j., ††	Bien toléré, le plus souvent des nausées, des diarrhées, des maux de tête, des troubles du sommeil. Rarement une prise de poids. Peu de données sur l'utilisation pendant la grossesse.
RAL	Raltegravir	ISENTRESS (MSD)	Comprimés: 400 mg, 600 mg Comprimés à croquer 25 mg, 100 mg	1 cp. 400 mg 2 × / j. ou 2 cp. 600 mg 1 × / j.	Bien toléré, occasionnellement une prise de poids. Rarement des vertiges, des troubles du sommeil, des maux de tête et des valeurs hépatiques élevées.
INHIBITEURS DE PROTÉASE (IP)					
ATV	Atazanavir	Original: Reyataz (BMS) Générique: Mepha	Capsules: 150 mg, 200 mg et 300 mg	400 mg seul 1 × / j. 300 mg + 100 mg RTV 1 × / j., ††	Souvent, les yeux jaunes (augmentation de la bilirubine), nausées et des diarrhées. Relativement rarement des maux de tête et une prise de poids. Rarement des calculs rénaux. Contre-indiqué avec les bloqueurs d'acide gastrique.
DRV	Darunavir	Original: Prezista (Janssen) Génériques: Mepha, Mylan, Sandoz	Comprimés: 400 mg, 600 mg et 800 mg, Solution buvable	800 mg + 100 mg RTV 1 × / j. ou 600 mg + 100 mg RTV 2 × / j. ou 800 mg + 150 mg Cobi 1 × / j. (en combinaison avec TAF+FTC), ††	Fréquemment, des nausées et des diarrhées. Rarement une éruption cutanée, des calculs rénaux, une prise de poids.
FPV	Fosamprenavir	Telzir (ViiV)	Comprimés : 700 mg	1 cp. 2 × / j. + 100 mg RTV 2 × / j.	Fréquemment des diarrhées et une prise de poids, rarement des éruptions cutanées et des nausées. Non recommandé pendant la grossesse. Contre-indiqué avec le sildénafil (par ex. Viagra).
LPV/r	Lopinavir et Ritonavir	Kaletra (AbbVie)	Comprimés: 100 mg, 200 mg, Sirop : 80 mg ou 20mg/ml	400 mg + 100 mg RTV 2 × / j.	Fréquemment des nausées et des diarrhées ainsi qu'une prise de poids.
TPV	Tipranavir	Aptivus (Boehringer Ingelheim)	Comprimés : 250 mg	2 cp. 2 × / j. + 200 mg RTV 2 × / j.	Principalement des diarrhées et des nausées, rarement des éruptions cutanées.
BOOSTER					
Cobi ou / c	Cobicistat	Tyboost (Gilead)	Comprimés: 150 mg	Pour renforcer («booster») d'autres inhibiteurs de la protéase (PI) : 150 mg, ††	Fréquemment des nausées et des diarrhées, rarement une prise de poids. Toutes les combinaisons avec le Cobicistat sont à éviter en cas de grossesse.
RTV ou / r	Ritonavir	Norvir (AbbVie)	Comprimés: 100 mg	Pour renforcer («booster») d'autres inhibiteurs de la protéase (PI) : 100 mg, ††	Fréquemment des nausées et des diarrhées ainsi qu'une prise de poids.

COMBINAISONS FIXES AVEC 2 MOLÉCULES

Abréviations	Molécules	Produits	Formes	Doses standard chez l'adulte	Effets indésirables
COMBINAISONS FIXES DE 2 INTI					
3TC et ABC	Lamivudine et Abacavir	Original: Kivexa (ViiV) Génériques: Mepha, Sandoz	Comprimés avec 600 mg ABC et 300 mg 3TC	1 cp. 1 × / j.	
TAF et FTC	Ténofovir alafénamide fumarate et Emtricitabine	Descovy (Gilead)	Comprimés avec 10 mg ou 25 mg TAF et 200 mg FTC	1 cp. 1 × / j.	voir les molécules
TDF et FTC	Ténofovir disoproxil fumarate et Emtricitabine	Original: Truvada (Gilead) Génériques: Mepha, Mylan, Sandoz	Comprimés avec 245 mg TDF et 200 mg FTC	1 cp. 1 × / j., ††	
COMBINAISONS FIXES INTI & INI					
3TC et DTG	Lamivudine et Dolutegravir	Dovato (ViiV)	Comprimés avec 50 mg DTG et 300 mg 3TC	1 cp. 1 × / j.	voir les molécules
COMBINAISONS FIXES INNTI & INI					
DTG et RPV	Dolutegravir et Rilpivirine	Juluca (ViiV)	Comprimés avec 50 mg DTG et 25 mg RPV	1 cp. 1 × / j., ††	voir les molécules

COMBINAISONS FIXES AVEC 3 MOLÉCULES OU PLUS

Abréviations	Molécules	Produits	Formes	Doses standard chez l'adulte	Effets indésirables
TDF, FTC et EVG/c	Ténofovir disoproxil fumarate, Emtricitabine et Elvitegravir/ Cobicistat	Stribild (Gilead)	Comprimés avec 150 mg EVG, 150 mg Cobi, 200 mg FTC, 245 mg TDF	1 cp. 1 × / j., ††	
TAF, FTC et EVG/c	Ténofovir alafénamide fumarate, Emtricitabine et Elvitegravir/Cobicistat	Genvoya (Gilead)	Comprimés avec 150 mg EVG, 150 mg Cobi, 10 mg TAF et 200 mg FTC	1 cp. 1 × / j., ††	
TDF, FTC et EFV	Ténofovir disoproxil fumarate, Emtricitabine et Efavirenz	Original: Atripla (Gilead) Génériques: Mepha, Mylan	Comprimés pelliculés de 600 mg EFV, 200 mg FTC et 245 mg TDF (équivalent à 300 mg TAF)	1 cp. 1 × / j. A jeun, avant d'aller se coucher	
TDF, FTC et RPV	Ténofovir disoproxil fumarate, Emtricitabine et Rilpivirine	Eviplera (Gilead)	Comprimés avec 25 mg RPV, 245 mg TDF et 200 mg FTC	1 cp. 1 × / j., ††	voir les molécules
TAF, FTC et RPV	Ténofovir alafénamide fumarate, Emtricitabine et Rilpivirine	Odefsey (Gilead)	Comprimés avec 25 mg RPV, 25 mg TAF et 200 mg FTC	1 cp. 1 × / j.	
TAF, FTC et BIC	Ténofovir alafénamide fumarate, Emtricitabine et Bictegravir	Biktarvy (Gilead)	Comprimés avec 50 mg BIC, 25 mg TAF et 200 mg FTC	1 cp. 1 × / j.	
TDF, 3TC et DOR	Ténofovir disoproxil fumarate, Lamivudine et Doravirine	Delstrigo (MSD)	Comprimés avec 100 mg DOR, 300 mg TDF et 300 mg FTC	1 cp. 1 × / j.	
TAF, FTC et DRV/c	Ténofovir alafénamide fumarate, Emtricitabine, Darunavir et Cobicistat	Symtuza (Janssen)	Comprimés avec 800 mg DRV, 150 mg Cobi, 10 mg TAF et 200 mg FTC	1 cp. 1 × / j.	
ABC, 3TC et DTG	Abacavir, Lamivudine et Dolutegravir	Triumeq (ViiV)	Comprimés avec 50 mg DTG, 600 mg ABC et 300 mg 3TC	1 cp. 1 × / j.	

†† avec un repas

Interaction entre les traitements anti-VIH, entre ces traitements et d'autres médicaments ou des substances psychoactives hiv-druginteractions.org/checker.

En cas de grossesse, la Névirapine et toutes les combinaisons avec le Cobicistat sont à éviter. Le Dolutegravir, l'Efavirenz et le Ténofovir (TAF ou TDF) sont les molécules à privilégier.

Cet aperçu a été créé avec tout le soin qui s'impose. Pour autant, toutes les informations doivent toujours être utilisées dans le cadre des conseils médicaux correspondants. L'aperçu ne présente qu'une sélection des informations disponibles sur les agents antirétroviraux. Pour une description complète des médicaments (effets indésirables, etc.), veuillez demander conseil à votre médecin, lire la notice d'emballage ou visiter les sites Internet www.swissmedinfo.ch et compendium.ch.

Vous pouvez télécharger le tableau à l'adresse shop.aids.ch/seropo. 8^{ème} édition actualisée en 2023 (disponible en ligne) D/F